

# Tostop

## FORTE

Bromhexina 200 mg/100 ml

Alivia el catarro bronquial y la tos con flema.



# mucolítico y expectorante

DE LAS SECRECIONES BRONQUIALES

ELIXIR

120 ml  
VENTA LIBRE

SAVANT

# Tostop

## FORTE

Bromhexina 200 mg/100 ml

Alivia el catarro bronquial y la tos con flema.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN  
ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

### • ¿Qué contiene TOSTOP FORTE?

TOSTOP FORTE contiene 200 miligramos de bromhexina clorhidrato cada 100 mililitros de elixir. Otros componentes del elixir: Metilparabeno sódico; Propilparabeno sódico; Aceite de castor hidrogenado; Carbopol; Glicerina; Alcohol etílico; Mentol; Sucralosa; Sorbitol; Hidróxido de sodio; Esencia de miel; Colorante caramelo; Agua purificada c.s.p. 100 ml.

**Contenido alcohólico: 2,40 % P/V.**

### **Acción:**

Mucolítico y expectorante de las secreciones bronquiales.

### • ¿Para qué se usa TOSTOP FORTE?

TOSTOP FORTE se utiliza para el Alivio sintomático del catarro bronquial y la tos con flema, facilitando su expectoración.

### • ¿Qué personas NO pueden recibir TOSTOP FORTE?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a la bromhexina o a alguno de los ingredientes de la fórmula. No utilizar en personas con dificultad para expectorar, que padezcan enfermedad del hígado o riñón o pacientes con asma.

Por su contenido de alcohol etílico (2,4%), no se aconseja su uso en niños menores de 6 años.

### • ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar TOSTOP FORTE?

Este medicamento debe ser utilizado con precaución en pacientes con úlcera gastrointestinal. Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, si sufre de diabetes o es intolerante a ciertos azúcares consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Dado que durante el tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede ser indispensable en pacientes incapaces de expectorar.

**Este medicamento contiene alcohol (2,4%)**

### • ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando TOSTOP FORTE?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, raramente pueden aparecer molestias gastrointestinales (náuseas, ardor) o reacciones alérgicas, como por ejemplo erupción de la piel, edema en la cara, dificultad para respirar, aumento de la temperatura y escalofríos.



No debe ingerirse este medicamento si usted está tomando al mismo tiempo productos antituberculosos.

SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O NO MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU MÉDICO.

NO ADMINISTRAR ESTE PRODUCTO POR MÁS DE 5 DÍAS.

• **¿Cómo se usa TOSTOP FORTE?**

Adultos y Niños mayores de 12 años: 5 ml (1 cucharada de té) 3 veces por día, cada 8 horas.

| TABLA DE DOSIFICACION |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDAD                  | +12 años                                                                                                                                                                                      |
| DOSIS INDICADA        |  5 ml<br>1 cucharada de té  |
| FRECUENCIA            | 3 veces por día (cada 8 horas)                                                                                                                                                                |

Por su contenido de alcohol etílico (2,4%), no se aconseja su uso a niños menores de 6 años.

• **¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?**

Ante la eventualidad de una sobredosisificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas

Tel.: (011) 4654 6648

Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)

Tel.: (011) 4961 8447

• **¿Tiene usted alguna pregunta?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

• **Forma de Conservación:**

Mantener a una temperatura entre 15° C y 30° C, lejos del calor y la luz solar directa.

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.  
Complejo Industrial RN N°19, Km 204  
Córdoba – CP: X2432XAB  
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto  
Farmacéutico.  
E.M.A.M.S. Certificado N° 52112  
Elaborado en Argentina

1003690

Emisión: 03/14

Revisión: 03/12

Presentación: 1 frasco por 120 ml.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

0810-444-32267

[www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

**SAVANT**